鑑定シタ、三四個採テ宿屋デ先着ノ先生ニオ目ニカケタラ「コンナ大切ナモノヲ何故モット取テ來ンカ」ト一喝喰サレタノデ翌日更ニ其近邊ヲ一同デ捜シタガアトハ不完全ノ子嚢體數箇ヲ得タニ過ギナカッタ、雄性體ハ勿論消滅シタ跡デ子嚢ト雖大分老境ニ入タモノデアル、恐ク此蘚ノ子嚢體ノ眞盛リハ雪ノ下デアラウ、又着生物ハ軟カニ腐タ木ノ幹デ近邊ニハよつばごけ Georgia pellucida (L.) Rabh. ガ一杯ニ擴ッテ居タ

○杜仲軒赭鞭夜話（十六）

久內清孝

●吳茱萸ノ威力

芸香科ニ天籍ヲ有シ各地ニ栽培サレ、相模、伊豆地方デハ其枝葉ガ果實ト共ニ冬期浴湯用ニ供サレ一種獨自ノ臭氣ヲ有スル吳茱萸卽チ Evodia rutaecarpa Benth. ノ果實ハ古來漢方藥トシテ用ヒラレタトノコトデアル、然ルニ朝比奈博士ガコレカラ發見サレタモノデ Rutamin. ト云フ名稱デ知ラレタ藥ガ色々ナコトニ効クノハ「第一製藥會社」ノ說明書ヲ見レバ明カデアルガ余ハ其說明以外ニ卽チ製造元ノ知識以上ニ有効ナル事實ヲ認メザルヲ得ナイノデアル

卽チ余ノ知人某ガ眼底ノ毛細管ノ出血ニ惱ミ居タルヲ以テ藥學博士塚本赳夫氏ニ謀リタルニ同氏ハ Rutamin ノ注射ヲ試ミヨト注意サレタルヲ以テ直チニ本人ニ告ゲタル處本人ハ早速某醫師ニ依賴シテ其注射ヲ行ヒ數日後主治醫ニ眼底ノ檢査ヲ乞ヒシニ新ラシキ出血ヲ認ムル能ハザルニ至レリトノコトナルノミナラズ本人ノ自覺ニ於テモ其結果良好ナルニ至レリ

Rutamin ノ發見ハ藥學界周知ノ事實デアルデアラウ、マタ某々疾病ニ有効ナル事實ハ旣ニ知ラレテ居ルデアラウ、然レ共「眼底毛細管ノ出血」ノ如キ場合ニ良好ナル結果ガ得ラルヽコトノ確信ヲ有スル人ガ、マタソレヲ知

ル人ガ世間ニ果シテ何人居ルデアラウカト考フルトキ吾等多年植物ニ親シムモノトシテハ之ヲ一般ニ報ジ一ハ吳茱萸ノ威力ヲ世ニ傳ヘ他ニハ斯ノ如キ醫家ニ治療ノ秘法ナキ疾患ニ苦シム人ノ參考ニ供シタイノデアル



ごしゅゆ　吳茱萸 (Evodia rutaecarpa Bentn.)
Siebold et Zuccarini, Flora Japonica, I. tab. 21.

實ハ斯クノ如キ記事ハ植物ニ關係ヲ有スルコト勿論ナレドモ、マタ藥界ニモ關係スルコト少カラザルヲ以テ余ハ「日本藥報」ニ投稿シタル處 Rutamin ノ宣傳ニナル慮レアリトノ理由ニヨリ掲載ヲ斷ラレタ、然シナガラ余ハ何ンノ必要アリテ一製藥業者ノ提灯ヲ持ツノ要アランヤデアル、卽チ余ハ宣傳ノ爲メニ執筆シタノデナク事實ヲ報ジタルニ過ギナイノデアル、結果ガ宣傳ニナルカラトテ事實ノ報ヲ阻止スル如キハ智者ノ態度カモ知レナイガ決シテ勇者ノ態度デハナイ、論語爲政篇ニ曰ク見義不爲無勇也ト尤モソンナコトハ今ノ

世デハ通用ハシマイガ尙上文中ニ知人某ト記セシハ横濱市立實業學校教諭武安成人ト云フ英語ノ先生デアル

●あけびノ怪

昭和六年夏某日東大中井博士ノ嚴肅ナルお室ニ於テいんちき植物ニツキ眞面目ニナッテ談話ヲシテ居タ處何カ思ヒ出シタ樣ニ中井さんガ鋏ヲ手ニシテ駈歩デ室外ヘ出テ行カレタノデ氣ノ弱イ僕ハ驚イテ唖然トシテ居タ處ヤガテ園内カラあけびノ蔓ヲ一抱ヘト云フト少シ誇大デアルガマー若干持ッテ汗ヲ流シナガラ這入ッテ來ラレタ、而シテ曰ク之ハ正ニいんちき百「パーセント」ダト驚異ノ眼ヲ以テ恭シク之ヲ覗フニみつばあけびノ小葉片ノ左右兩片ガ各二片ニ別レ所謂趾形ヲナシテ居ルノデアル此レナドハ碧眼ノ先生ニデモ見セタラ恐ラク Nov. sp. デアラウ

●やまほとゝぎすノ不定根

同年秋深ク樹々ノ梢早ヤ黄葉ニ近キ頃相州双子山ノ溪谷ヲ歩キタルニ林下ニ生ゼシやまほとゝぎすガ莖ノ節カラ多數ニ不定根ヲ發出シテ居タ、其處デ同行ノ某氏奇聲ヲ發シテ曰ク善哉々々植木屋ガほとゝぎすヲ挿木ニスルノハ

●からたちばなノ果實ハ胎生スルカ

からたちばなノ果實ノ側面ニ異狀アリ具ニ之ヲ見ルニ果皮ヲ破リテ外出セル突起ナリ、而シテ其突起ハ言フ迄モナク發芽ニ際シ發現セル胚ノ根部ナルガ如シ

●おらんだせんにちノ帶化

おらんだせんにちヲ栽培シテ居ルト花穗部ガ帶化ヲスルコトモアル、其程度ニヨリ花穗ノ形ハ種々ナル形容語ヲ用ヒナケレバナラナイ程變ル

●斑入やぶめうが

普通ノやぶめうがノ葉ニ白色縦條ガ數條發現シタモノガアル卽チ斑入リデアル、何處ニモアルガ昨年相州神武寺ノ林中デ之ヲ見タ

●えだうちをかとらのを

をかとらのをハ通常一本ノ花穗ヲ有スルモノガ多イガ余ハ昨年ノ夏、分枝六本ニ及ビ其各ニ花穗ノ現レテ居ルノヲ得タ、コノ場合中央卽頂部ノ花穗ガ最モ長大デアルコト言フ丈野暮デアル

●おにどころノ金魚葉

昨年ノ夏武州登戸ノ叢中ニ於テおにどころノ葉二個ガ合シテ完全ナ金魚葉ニナッテ居ルノヲ得タ、コレハ一個ノ葉ガ別レテ金魚ノ尾鰭化シタノデハナイト思フ

●ながぼのなつのはなわらびノ穗ニ葉ノ出現

武州陣馬山ノ山中デながぼのなつのはなわらびノ穗ノ上部約三「セ・メ」位ノ處ニ一回羽裂ノ長サ五「セ・メ」程ノ葉片ガ二個發生シテ居ルノヲ得タ

●えぞにう

東大農學部林學實科ノ前島清實氏ハ福島縣双葉郡上野上ニ於テ昨年夏えぞにうノ小繖花序ニ長サ二「セ・メ」位ナ葉狀苞片ガ四個宛出テ居ルノヲ得タ、從ッテ複繖花ハ甚ダ複雜ニ見エテ美シイ

●さるひや

さるひや Salvia officinalis L. ノ葉ノ基部ニ左右二個ノ耳形ニ裂ケタ處ガ出來其各ニハ中肋ラシイモノモ現レタ結果基部ニ二個ノ小葉片ヲ有スル複葉ノ樣ナモノガ出ルコトガアル、コレハ昨年實見シタ所デアル

●單葉ノはぎ

單葉ノはぎト言ッタラひとつばはぎト合點スル人ガアルカモ知レナイガ今言フ所ノモノハさはぎノ葉ノ單葉ニ

ナッタモノデ如何ニモ珍デアル、林業試驗場柳田由藏氏ガ房州清澄山ニ得ル所デアル

●にりんさうノ花被ガ葉化シタコト

にりんさうノ仲間即チ Anemone 屬ハ單花被ヲ有スルコトニナッテ居ルガアノ美イ花ヲ見テ單花被トハ事實ノ如何ニ關セズ氣ノ毒ナ感モスルガ余ガ昨年夏武州御嶽デ得タモノハ其單花被ガ普通ノ三四倍位ニナリ總テ全ク綠色デ邊緣ガ白色ニ緣取ラレテ居タ、即チ葉カラ變ッタ花被ガマタ元ノ葉ニ逆戻リシタト云フ形デアル

●斑入ノかなむぐら

獨逸カラ斑入ノかなむぐらノ種ヲ手ニ入レタカラ播種シテ見タラ看板ニ僞リナク斑入ガ出テ來タ、何レ日本カラ洋行シテ歸朝シタモノデアラウガ若干美シイモノデアル、勿論野外ニモ之ヲ見ルコト稀ナラズ

●つりがねにんじんノ蕚片ハ多形ナリ

廣ク野外ニ於テつりがねにんじんヲ見タ人ナラ此植物ハ葉ガ花ガ、マタ其花ノ花冠ガ蕚片ガ個體毎ニ變化シテ居ルト云ヒタイ程變化ニ富ンデ居ルノミナラズ花色マデ千差萬別デアルコトニ異存ハナカラウ、其內デ森信之君ガ武州高尾山デ採ラレタモノハ蕚片長サ約一「セ・メ」半ニ達シ各ガ羽裂シテ居タ、蓋シ可ナリいんちきノ個體デアル

○葛

津村研究所　木村雄四郎

葛（くず）ノ名ハ夙ニ萬葉集ニモ見エ又秋ノ七草ノ一ニ數ヘラレテヰル程デアルカラ我國デハ可ナリ古クカラ一般ニ知ラレ且ツ親シマレタ植物デアル、從ッテ葛ニ就テハ文學的ニモ興味アル文獻ニ乏シクナイガ玆ニハ葛ノ應用方面特ニ藥用及食用トナル迄ノ經緯ニ就テ極ク概括的ニ述ベテ見タイ